


PREDIKO Gyn s.r.o. • Lešetín I 6966, 760 01 Zlín
IČ: 29363551 • IČZ: 82815000



Dotčená osoba:

Jméno/příjmení: /

Číslo pojištění: /

Informovaný souhlas pacientky se zavedením nitroděložního tělíska

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn princip provedení výkonu a byla jsem seznámena s možnými komplikacemi. Informacím rozumím a současně jsem měla možnost klást otázky a získat na ně přiměřenou odpověď. Souhlasím se zavedením nitroděložního tělíska.

podpis registrované pacientky

Vlastní výkon

Běžně se provádí ambulantně a bez podávání analgetik či anestezie. Přístup k dutině děložní je přes pochvu. Po zavedení gynekologických zrcadel (jako při běžném vyšetření) se provede desinfekce pochvy a děložního čípku, poté se uchopí děložní čípek do speciálních kleští (je možné pocítit lehkou bolest či štípnutí) následně se do dutiny děložní zavede jemný nástroj děložní sonda (velmi tenká tyčinka), kterou se zjistí volná průchodnost kanálu děložního hrdla a dutiny děložní. Je-li kanál volný, uloží se zavaděčem (ten je pro každé tělísko připraven přímo výrobcem a je součástí originálního balení spolu s tělískem) nitroděložní tělísko do dutiny děložní, zavaděč se vyjme a nůžkami se zkrátí vlákna tělíska tak, aby nebyla pro pacientku obtěžující a současně umožňovala snadné vyjmutí tělíska. Tím je výkon ukončen a vyšetřovací zrcadla jsou odstraněna z pochvy.

Před vlastním výkonem a i po té Vám bude provedeno ultrazvukové vyšetření, jehož důvodem je ověřit si uložení dělohy, vyloučit aktuální stavy, které by bránily zavedení tělíska a následně správné uložení tělíska po výkonu. Při výkonu a po něm může dojít k zvýšení intenzity krvácení.

Po výkonu je vhodné alespoň 14 dnů dodržovat pohlavní abstinenci a zvýšenou hygienu zevních rodidel. Také není bezprostředně po výkonu vhodné zavádění menstruačních tamponů, tak by mohlo dojít k event. posunu tělíska při zamotání vláken tělíska do tamponu. Krvácení ustává po výkonu do týdne.

Komplikace výkonu

U žádné pacientky nelze zaručit ideální a nekomplikovaný průběh výkonu. I přes pečlivou přípravu a provedení vlastního výkonu může dojít k poškození a poranění dělohy, které si vyžádá provedení akutního operačního výkonu bezprostředně po komplikaci. Toto je komplikace, která může vzniknout bezprostředně při výkonu. Další komplikace mohou vznikat v průběhu doby, kdy má žena řádně zavedené tělísko.

Jsou to následující:

- selhání antikoncepční metody – vznik těhotenství, a event. i možnost vzniku mimoděložního těhotenství
- vypuzení nitroděložního tělíska do hrdla děložního, pochvy nebo dutiny břišní
- bolesti v podbříšku a abnormální krvácení
- infekce zánětlivá pánevní nemoc
- komplikace spojené s vytažením tělíska: rozlomení tělíska zadržení části tělíska v děloze

Ve Zlíně dne

podpis lékaře a otisk razítka